

ED治療薬を処方された患者さんへ

※重要事項

- ・割線の入ってない薬は割らずに1錠で服用してください。効果が出ないことがあります。
- ・治療中の病気や常用薬がある場合は、必ず医師に申告をしてください。
- ・ED治療薬には併用注意、または併用禁忌な薬があります。
- ・常用薬の変更、新たに治療を始めた、手術をされたなど、体調に変化が起こった際には必ず医師に申告をしてください。

ED薬について

1、食事の影響

ED薬は空腹時に服用するのが最良です。

食後に服用する場合は、2時間以上あけてから服用してください。

2、アルコールの影響

少量のアルコールの摂取はリラックス効果もありますが、飲み過ぎにご注意ください。本来の効果が出なくなる可能性もございます。

3、有効性

ED薬は8割以上の方に有効性があり、効果が期待できます。

加齢や糖尿病、高血圧による動脈硬化が進んでいる場合、血管が柔らかくなりにくいので有効成分を多く体の中に入れた方が効果が期待できます。

4、薬の働き

ED薬を服用すると、薬の成分によって血管が広がります。そして血流が良くなり、陰茎部に十分な血液が流れ、勃起のサポートをしてくれます。血流を良くするだけなので、性的刺激がなければ勃起することはありません。服用による「依存性」「性欲増進作用」はありません。




5、副作用

ED薬の血管拡張作用により「顔のほてり」「頭痛」「鼻づまり」といった症状がでることがあります。時間が経てば自然に収まりますが、気になる場合は市販の頭痛薬や鼻炎薬を併用していただいて構いません。

薬剤について

ED薬は3種類ありますが、勃起の手助けをする効果はほぼ同じです。しかし、薬に含まれる成分が異なるため、効果や感じ方には個人差があります。

初めての方は3種類を飲み比べ、ご自身に合ったものを探して頂くことをお勧めします。

種類	シアリス	レビトラ	バイアグラ
有効成分	タダラフィル	バルデナフィル	シルデナフィル
有効成分量	10mg/20mg	10mg/20mg	50mg
剤形			
作用するまで	服用後：1時間	服用後：30分	服用後：1時間
持続時間	約36時間	約8時間	約4時間
服用について	食前食後問わず	食前食後問わず	空腹時
食事の影響	○ ほぼ受けない	△ 油ものは注意	× 受けやすい
飲酒	△ 少量なら可	△ 少量なら可	× 効果減弱
薬の特徴	長時間有効	即効性がある	食事の影響で効果が落ちる
ジェネリック 厚生労働省認可	×	×	○

※バイアグラ50mgはシアリス・レビトラの10mgに相当
バイアグラの50mgよりもシアリス、レビトラの20mgの方が効果が出やすい。

遠隔診療のご案内

このたびイースト駅前クリニックでは、再診で来院が困難な方へ向けての遠隔診療（電話での問診・お薬の配送）を開始致しました。

遠方でなかなか来院できない方、忙しくて診察時間内に来院できない方など対面処方難しい方のために、電話を用いて対応させていただきます。

* 診察の流れ

1. 自宅・携帯電話から札幌院にお電話ください。
（診察券番号にてカルテの検索・確認をします。）
2. 医師との問診を行います。
現在の服薬状況、健康状態・既往症の変化などを確認します。
3. 問診後、処方に問題なければお薬配送となります。

* 処方薬はヤマト運輸にてお送りします。

送料手数料は患者様ご負担。お支払方法は代金引換のみです。

発送：診察日の翌日発送、一週間以内で日時を指定できます。

指定の住所に配送やヤマト運輸の営業所止めにする
ことも可能です。（コンビニは不可）

その他、ご不明なところがございましたらクリニック・スタッフまでお気軽にご相談ください。

